

経鼻生インフルエンザワクチン（フルミスト点鼻液）説明書

このワクチンはインフルエンザウイルスを弱毒化した生ワクチンです。

接種後、軽くインフルエンザに罹ったような症状がでることがあります。主な副反応は、鼻水、鼻づまり、咳、のどの痛み、頭痛などがあります。また、重い副反応としてショック・アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難、血管性浮腫など）や、けいれんやギランバレー症候群などの報告があります。

◆ フルミスト点鼻液で予防接種を受けることができない方

- ☐ 発熱している（37.5℃以上）、鼻汁、鼻閉がある方
- ☐ 重い急性疾患を患っている方
- ☐ 過去にフルミスト点鼻液で、アナフィラキシー（接種後30分以内に出現する呼吸困難や蕁麻疹などを伴う重いアレルギー反応）を起こしたことがある方
- ☐ **免疫機能に異常がある病気で、免疫抑制をきたす治療を受けている方**
- ☐ 経口または、注射の**副腎皮質ホルモン剤で治療中の方**
- ☐ その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した場合

◆ 以下に当てはまる方は、医師と相談してください ※当てはまるものすべてにチェックしてください

- ☐ **ゼラチン**を含む製剤や食品に対し、ショック・アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難、血管性浮腫など）などの過敏症を起こしたことがある。
- ☐ **心臓血管系、腎臓、肝臓、血液疾患などの疾患**がある。
- ☐ 過去に予防接種2日以内に発熱や全身性の発疹などアレルギーを疑う症状が出たことがある。
- ☐ 過去に**けいれん（ひきつけ）**を起こしたことがある。
- ☐ 過去に**免疫機能の異常**を指摘された、または**近親者に先天性免疫不全症**の方がいる。
- ☐ 重い**喘息（ぜんそく）**または、喘鳴の症状がある。
- ☐ 薬や食事（**鶏卵、鶏肉、その他鶏肉由来のもの**）で発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある。
- ☐ 発育が遅く、医師等の指導を受けている。
- ☐ サリチル酸系医薬品（**アスピリン**など）、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸を服用中である。

上記に該当する方は、医師の判断により、フルミスト点鼻薬の使用を控え、不活化ワクチンの「インフルエンザHAワクチン」（皮下注射）を使用する場合があります。医師にお子さんの健康状態をきちんと伝え、相談してください。

◆ 予防接種を受けた後の注意事項

- ☐ 接種後は、ショック・アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難、血管性浮腫など）が起こることがあります。
- ☐ 接種当日の運動は控えてください。健康状態に十分注意し、体調の変化、高熱など異常がある場合は、すぐに医師の診断を受けてください。なお、入浴は差し支えありません。
- ☐ このワクチンは「生ワクチン」です。**接種後1～2週間はウイルスを排出していることから、周囲の人に感染することがあります。免疫不全の方、妊娠、授乳中の方がいる場合は、可能な限り接触を避けてください。**
- ☐ フルミスト接種後、他ワクチンを接種する場合は接種間隔を4週間あけることを推奨します。
- ☐ このワクチンを接種後に、インフルエンザ簡易検査で陽性になることがあります。